

Серия 27. Теорема Кронекера

- Дано положительное иррациональное число α , меньшее 1. Кузнечик прыгает по окружности длины 1. За каждую секунду он прыгает по часовой стрелке на дугу длины α .
 - Докажите, что когда-нибудь он окажется на расстоянии меньше чем $1/1000$ от своего исходного положения (расстояние считается по окружности).
 - Докажите, что кузнечик рано или поздно посетит любую наперёд выбранную дугу окружности. Верно ли, что он посетит любую наперёд заданную точку окружности?
 - (*Теорема Кронекера*). Докажите, что если $\alpha > 0$ — иррациональное число, то произвольный интервал (a, b) числовой прямой содержит число вида $n\alpha - m$, где m, n — неотрицательные целые числа. (Иными словами, множество значений выражения $n\alpha - m$ всюду плотно на числовой прямой).
- Кузнечик прошел курсы повышения квалификации и теперь он умеет делать два прыжка: с длинами $\sqrt{2}$ и $\sqrt{3}$ в обе стороны. Теперь кузнечик готов прыгать по прямой. Докажите, что он сможет попасть в любой отрезок на прямой.
- В каждой точке координатной плоскости с целыми координатами сидит круглый дятел радиуса $r > 0$. У дятла в точке $(0, 0)$ есть ружьё. Докажите, что в каком бы направлении он не стрельнул, пуля попадёт в другого дятла.
- (*Теорема Дирихле*)
 - Докажите, что для любых вещественного α и натурального N найдутся такие целые m и $0 < n \leq N$, что $|n\alpha - m| < 1/N$.
 - Докажите, что для любых вещественных $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ и для любого натурального N существуют такие целые m_1, \dots, m_k и $0 < n \leq N^k$, что одновременно выполнены неравенства

$$|n\alpha_1 - m_1| < \frac{1}{N}, |n\alpha_2 - m_2| < \frac{1}{N}, \dots, |n\alpha_k - m_k| < \frac{1}{N}.$$

- Докажите, что степень тройки с натуральным показателем может начинаться на любую комбинацию цифр.
 - Докажите, что степень двойки может начинаться на те же 2017 цифр, что и оканчиваться (конечно, число при этом должно быть минимум 4034-значное).
- На прямой конечное число отрезков суммарной длиной 2.41 покрашено чёрным, в одной из черных точек сидит кузнечик. Он умеет прыгать по прямой на 1 влево или на $\sqrt{2}$ вправо. Докажите, что он не сможет всё время оставаться на черной части прямой.